

BARTONELLOSE: BACTERIEMIE ASYMPTOMATIQUE

• Clinique

- Zoonose.
 - Réservoir: inconnu (*Bartonella quintana*), chats (*Bartonella henselae*).
 - Vecteurs: mouches, poux, tiques,
- Généralement pas diagnostiqué (trouvaille occasionnelle).
- Surtout vue chez les sans-abri, alcooliques,
- Peut mener à fièvre des tranchées, endocardite (toujours à exclure en cas de bactériémie à *Bartonella quintana*).
- Centre national de référence belge: ITG, Anvers (laboratoires associés: Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, et CERVA, Bruxelles).

• Pathogènes impliqués

- *Bartonella henselae*.
- *Bartonella quintana*.

• Traitement anti-infectieux empirique

- Aucun (traitement documenté).

• Traitement anti-infectieux documenté

- Régime: doxycycline + gentamicine.
- Posologies standard.
 - Doxycycline: 200 mg po q24h or 100 mg po 12h.
 - Gentamicine: doses de ± 3 mg/kg iv administrées aux intervalles les plus courts (minimum 24 heures) permettant d'atteindre des concentrations sériques de vallée de $< 1 \mu\text{g/ml}$.
- Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté).
 - Doxycycline: 28 jours.
 - Gentamicine: 14 jours.