

1. Description

A. Données socio-démographiques

1. Les interruptions de grossesse selon l'âge de la femme


age	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
10	0	0	0,00	0,00
11	0	0	0,00	0,00
12	1	1	0,01	0,01
13	15	12	0,09	0,07
14	67	94	0,38	0,52
15	210	201	1,19	1,11
16	357	379	2,02	2,10
17	529	528	3,00	2,93
18	669	658	3,79	3,65
19	766	835	4,34	4,63
20	879	845	4,98	4,69
21	813	925	4,61	5,13
22	841	910	4,77	5,05
23	889	897	5,04	4,97
24	888	846	5,03	4,69
25	885	895	5,02	4,96
26	918	852	5,20	4,72
27	771	872	4,37	4,84
28	807	763	4,57	4,23
29	703	774	3,99	4,29
30	743	818	4,21	4,54
31	641	659	3,63	3,65
32	633	666	3,59	3,69
33	619	614	3,51	3,40
34	555	612	3,15	3,39
35	600	597	3,40	3,31
36	564	532	3,20	2,95
37	463	485	2,62	2,69
38	467	396	2,65	2,20
39	369	365	2,09	2,02
40	303	313	1,72	1,74
41	210	223	1,19	1,24
42	185	181	1,05	1,00
43	137	139	0,78	0,77
44	66	59	0,37	0,33
45	35	41	0,20	0,23
46	24	23	0,14	0,13
47	8	15	0,05	0,08
48	3	5	0,02	0,03
49	4	3	0,02	0,02
50	1	0	0,01	0,00
51	1	0	0,01	0,00
52	1	0	0,01	0,00
totaal	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		

Moyenne d'âge 2006 : **27,40**

Moyenne d'âge 2007 : **27,33**

catégories d'âge	nombre					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
10-14	63	65	88	84	83	107
15-19	2059	2097	2188	2301	2531	2601
20-24	3692	4032	4002	4139	4310	4423
25-29	3339	3411	3628	3873	4084	4156
30-34	2904	3001	3131	3093	3191	3369
35-39	1976	2107	2094	2248	2463	2375
40-44	700	810	836	882	901	915
45-49	57	67	53	74	74	87
50-54	0	1	1	0	3	0
total	14790	15591	16021	16694	17640	18033
pas de réponse	1	4	3	2	0	0
total général	14791	15595	16024	16696	17640	18033

catégories d'âge	%					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
10-14	0,43	0,42	0,55	0,50	0,47	0,59
15-19	13,92	13,45	13,66	13,78	14,35	14,42
20-24	24,96	25,86	24,98	24,79	24,43	24,53
25-29	22,58	21,88	22,65	23,20	23,15	23,05
30-34	19,63	19,25	19,54	18,53	18,09	18,68
35-39	13,36	13,51	13,07	13,47	13,96	13,17
40-44	4,73	5,20	5,22	5,28	5,11	5,07
45-49	0,39	0,43	0,33	0,44	0,42	0,48
50-54	0,00	0,01	0,01	0,00	0,02	0,00
total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
pas de réponse						
total général						




Selon les données de l'Inspection des Soins de Santé, les cliniques spécialisées des Pays-Bas ont pratiqué le nombre d'interruptions de grossesse repris ci-dessous sur des femmes provenant de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg :

En 2006 : **431** ont été pratiquées dans les cliniques frontalières de Eindhoven, Goes et Maastricht.

En 2007 : **416** ont été pratiquées dans les cliniques frontalières de Eindhoven, Goes et Maastricht.

2. Les interruptions de grossesse selon l'état civil


état civil	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
célibataire	11561	11827	65,54	65,59
mariée	4643	4859	26,32	26,95
divorcée	1361	1268	7,72	7,03
veuve	75	79	0,43	0,44
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



Les données officielles de l'état civil ne permettent pas de se faire une idée exacte de la situation réelle des patientes. Ainsi, une femme dont l'état civil est "mariée" peut vivre en couple avec son conjoint ou avec un autre partenaire, ou encore vivre seule, et une femme dont l'état civil est "célibataire" peut vivre en couple.

3. Les interruptions de grossesse selon le nombre d'enfants mis au monde


nombre d' Enfants	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
0	8467	8721	48,00	48,36
1	3841	3924	21,77	21,76
2	3209	3228	18,19	17,90
3	1420	1391	8,05	7,71
4	464	509	2,63	2,82
5	148	178	0,84	0,99
6	60	46	0,34	0,26
7	22	21	0,12	0,12
8	4	5	0,02	0,03
9	2	5	0,01	0,03
10	2	1	0,01	0,01
11	0	2	0,00	0,01
12	1	1	0,01	0,01
13	0	1	0,00	0,01
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



4. Les interruptions de grossesse selon le domicile de la femme

4.1. Données générales


domicile	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
Anvers	2661	2797	15,09	15,51
Flandre Occidentale	1258	1294	7,13	7,18
Flandre Orientale	1557	1447	8,83	8,02
Hainaut	1867	1936	10,58	10,74
Liège	1820	1910	10,32	10,59
Limbourg	874	961	4,95	5,33
Luxembourg	367	335	2,08	1,86
Namur	669	652	3,79	3,62
Brabant Flamand	1082	1149	6,13	6,37
Brabant Wallon	623	616	3,53	3,42
Bruxelles-Capitale	4566	4622	25,88	25,63
A l'étranger	296	314	1,68	1,74
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



4.2. Les femmes domiciliées à l'étranger: division par continent


origine	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
Europe	224	232	83,58	80,56
Afrique	22	25	8,21	8,68
Amérique	13	18	4,85	6,25
Asie	9	13	3,36	4,51
Océanie	0	0	0,00	0,00
total	268	288	100,00	100,00
pas de réponse	28	26		
total général	296	314		

Les totaux de ce tableau diffèrent de ceux du tableau précédent en ce qui concerne les femmes domiciliées à l'étranger; cette différence est due au fait que les déclarantes n'ont pas toujours mentionné le pays d'origine.
Les chiffres les plus exacts sont donc ceux qui figurent au tableau précédent 4.1.



5. Etablissements où se pratique l'interruption de grossesse

Type	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
hôpital	3351	3032	19,00	16,81
centre	14289	15001	81,00	83,19
total	17640	18033	100,00	100,00



B. Données psycho-sociales

6. situations de détresse invoquées

Liste des situations de détresse

A.00 problèmes de santé de la femme enceinte

A.01 problèmes de santé de l'enfant à naître

A.02 problèmes de santé mentale

B.13 la femme se sent trop jeune

B.14 la femme se sent trop âgée

B.15 étudiante

B.16 femme isolée

B.17 pas de souhait d'enfant pour le moment

B.18 famille complète

C.20 problèmes financiers

C.21 situation professionnelle

C.22 situation de logement

D.30 relation récemment interrompue

D.31 le partenaire n'accepte pas la grossesse

D.32 relation occasionnelle

D.33 relation trop récente

D.34 relation hors mariage

D.35 problèmes de couple

D.36 problèmes relationnels avec l'entourage

D.37 problèmes juridiques liés au divorce

E.40 viol

E.41 inceste

F.50 réfugiée politique

G.99 autres

Catégories de situations de détresse

A. Santé physique ou psychique de la mère ou de l'enfant à naître

B. Raisons personnelles

C. Raisons financières ou matérielles

D. Problèmes de couple ou de la famille

E. Grossesse suite à un viol ou un inceste

F. Réfugiée politique


G. Autres

liste	nombre		pourcentage	
	2006	2007	2006	2007
A.00	500	526	1,88	1,94
A.01	270	335	1,01	1,24
A.02	231	256	0,87	0,95
B.13	3253	3477	12,22	12,84
B.14	709	669	2,66	2,47
B.15	2458	2479	9,23	9,15
B.16	1011	824	3,80	3,04
B.17	3978	4271	14,94	15,77
B.18	2933	2867	11,02	10,58
C.20	2013	1920	7,56	7,09
C.21	1289	1394	4,84	5,15
C.22	382	415	1,43	1,53
D.30	1456	1521	5,47	5,62
D.31	759	721	2,85	2,66
D.32	595	658	2,23	2,43
D.33	1339	1297	5,03	4,79
D.34	631	724	2,37	2,67
D.35	1280	1336	4,81	4,93
D.36	369	393	1,39	1,45
D.37	151	118	0,57	0,44
E.40	56	59	0,21	0,22
E.41	2	1	0,01	0,00
F.50	637	497	2,39	1,83
G.99	321	330	1,21	1,22
total	26623	27088	100,00	100,00

C. Données médicales


7. Méthode de contraception la plus utilisée pendant le dernier mois

méthode	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
aucune	7507	7600	42,56	42,14
coït interrompu	604	636	3,42	3,53
abstinence périodique	930	803	5,27	4,45
spermicides	13	9	0,07	0,05
diaphragme	20	21	0,11	0,12
préservatif	2850	2958	16,16	16,40
pilule	4845	5110	27,47	28,34
injection contraceptive	36	35	0,20	0,19
DIU	184	181	1,04	1,00
stérilisation homme	35	39	0,20	0,22
stérilisation femme	18	12	0,10	0,07
stérilisation des deux	1	1	0,01	0,01
pilule du lendemain	178	198	1,01	1,10
implant	10	10	0,06	0,06
patch	146	154	0,83	0,85
anneau vaginal	212	203	1,20	1,13
méthode N.F.P.	22	25	0,12	0,14
autres	29	38	0,16	0,21
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



8. Causes d'échec de la contraception

cause	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
pas de contraception	8050	8231	45,63	45,64
utilisation incorrecte	6057	6118	34,34	33,93
inefficacité	2659	2670	15,07	14,81
ne sait pas	874	1014	4,95	5,62
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



Ces chiffres ont été établis à partir des déclarations faites par les femmes et ne peuvent être recoupés scientifiquement.

La commission ne possède pas de renseignements quant à la fréquence de l'utilisation des différentes méthodes de contraception au niveau de la population.


La publication de ces chiffres ne contient aucun jugement de valeur quant à la fiabilité des méthodes utilisées.

Cette réflexion concerne les tableaux 7 et 8.

D. Aspects médico-techniques du traitement


9. Méthode utilisée pour interrompre la grossesse

méthode	nombre		pourcentage	
	2006	2007	2006	2007
aspiration	13506	13941	76,56	77,31
curetage	1508	1178	8,55	6,53
prostaglandine	85	104	0,48	0,58
mifépristone	2455	2729	13,92	15,13
mifépristone + curetage	71	67	0,40	0,37
autres	15	14	0,09	0,08
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		




10. Anesthésie

méthode	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
aucune	2766	3028	15,68	16,79
loco-régionale	12406	12934	70,33	71,72
narcose	2446	2041	13,87	11,32
autres	22	30	0,12	0,17
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



11. durée d'hospitalisation

type	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
ambulatoire	15593	16313	88,40	90,46
24h ou moins	1910	1576	10,83	8,74
plus de 24h	137	144	0,78	0,80
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		



12. complications

type	nombre		%	
	2006	2007	2006	2007
aucune	17480	17878	99,09	99,14
perte de sang >500ml	43	53	0,24	0,29
perforation	31	12	0,18	0,07
déchirure	29	24	0,16	0,13
autres	57	66	0,32	0,37
total	17640	18033	100,00	100,00
pas de réponse	0	0		
total général	17640	18033		

