

SYFILIS: TERTIAIRE INFECTIE, LATE LATENTE INFECTIE, LATENTE INFECTIE VAN ONBE- KENDE DUUR

• *Klinische aspecten en commentaren*

- Symptomatologie.
 - Late latente syfilis: geen klinische manifestaties, opgelopen ≥ 1 jaar voor de huidige evaluatie.
 - Latente syfilis van onbekende duur: geen klinische manifestaties.
 - Tertiaire syfilis: gummata, cardiovasculaire syfilis (aortitis, ...),
- Meldingsplichtige infectie in het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Nationaal Belgisch referentiecentrum: ITG, Antwerpen.

• *Betrokken pathogenen*

- *Treponema pallidum*.

• *Empirische anti-infectieuze behandeling*

- Geen (gedocumenteerde behandeling).

• *Gedocumenteerde anti-infectieuze behandeling*

- Regime: benzathine penicilline G.
- Standaard posologie (benzathine penicilline G): 3 doses van 2,4 miljoen internationale eenheden toegediend met intervallen van 1 week [vervanging van een deel (0,5 tot 1 cc) van het oplosmiddel door een 1% lidocaïne oplossing zonder epinefrine kan de pijn bij injectie verminderen].
- Totale duur van de adequate (empirische + gedocumenteerde) anti-infectieuze behandeling: 2 weken (3 doses).